

Isolation und Quarantäne Vorgehensweisen des Ennepe-Ruhr-Kreises

Isolation für Infizierte

10 Tage Isolation

Gerechnet wird die Isolation ab Symptombeginn oder ab der Durchführung des PCR-Testes

Für den Symptombeginn sind folgende Symptome maßgeblich: Fieber, Atemnot, Geruchs- oder Geschmacksverlust, starker Husten

Verkürzung nach 7 Tagen mittels PCR- oder Schnelltest und mind. 48 Std. symptomfrei

Quarantäne für Kontaktpersonen

10 Tage Quarantäne

Gerechnet wird die Quarantäne ab Symptombeginn des Index oder ab der Durchführung des PCR-Testes des Index

Verkürzung nach 7 Tagen mittels PCR- oder Schnelltest

→ Für sonstige Kontaktpersonen (außerhalb des Haushaltes) ist bei der Berechnung der Quarantäne der Zeitpunkt des letzten Kontaktes maßgeblich!

Allgemein gilt

Wird die Testung zur Verkürzung nicht in Anspruch genommen, endet die Isolation/ Quarantäne mit Ablauf der 10 Tage ohne abschließende Testung, sofern die **positiv getestete Person** seit mind. 48 Stunden symptomfrei ist!

Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, etc.

10 Tage Isolation

Verkürzung nach 7 Tagen mittels PCR-Test und mind. 48.Std. symptomfrei

10 Tage Quarantäne

Verkürzung nach 7 Tagen mittels PCR- oder Schnelltest

Kinder und Jugendliche in Kitas, Schulen, etc.

Im Rahmen eines Ausbruchsgeschehen entscheiden die entsprechenden Teams über das weitere Vorgehen

10 Tage Isolation

Verkürzung nach 7 Tagen mittels PCR- oder Schnelltest und mind. 48.Std. symptomfrei

10 Tage Quarantäne

Verkürzung nach 5 Tagen mittels PCR- oder Schnelltest in einer anerkannten Teststelle (gem. § 1 Abs. 2 i.V.m. § 14 Abs. 4 Nr. 2 Test- und QuarantäneVO NRW)

Gem. RKI-Empfehlung ist die Testung mittels zertifiziertem Antigentest vor Schulbeginn in der Schule bei Kontaktpersonen im Schulsetting möglich.

Ausnahmen von der Quarantänepflicht (für Kontaktpersonen)

1. Personen mit einer Auffrischungsimpfung (Boosterimpfung), die insgesamt drei Impfungen erhalten haben (auch bei jeglicher Kombination mit dem COVID-19-Impfstoff der Firma Janssen (Johnson & Johnson))
2. geimpfte genesene Personen, die eine mittels PCR-Test nachgewiesene COVID-19- Infektion hatten und davor oder danach mindestens eine Impfung erhalten haben
3. Personen mit einer zweimaligen Impfung, bei denen die zweite Impfung mehr als 14, aber weniger als 90 Tagen zurückliegt
4. genesene Personen, bei denen der die Infektion bestätigende PCR-Test mehr als 27, aber weniger als 90 Tage zurückliegt.