




Herzlich Willkommen zur MRSA/ MRE-Netzwerk-Konferenz des Ennepe-Ruhr- Kreises




Fallbeispiel:

Ablauf der Durchführung einer MRSA-Abstrichserie bei Patientinnen/ Patienten der niedergelassenen Ärztinnen/ Ärzte, die durch ambulante Pflegedienste betreut werden


- Niedergelassener Arzt berichtet von Unstimmigkeiten zwischen sich und Mitarbeitern der APD bei der Sanierung von MRSA-Patienten
- APD gehen oft von 3 Abstrichen an drei aufeinander folgenden Tagen nach Eradikation aus
- Auch Angehörige der Patienten seien davon überzeugt, dass dies zutreffe
- Ggf. Konsultieren von Vertretungsärzten



Unterschiedliche Schemata bei Sanierung von ambulanten und stationären MRSA-Patienten



Wahrnehmung von Schulungen und Fortbildungen für Mitarbeiter von Ambulanten Pflegediensten



Einrichtungsübergreifende Koordination anstreben

MRE-Übergabebogen

Platz für Ihr Logo/ Ihren Stempel



Patientenaufkleber (Patientendaten)

Verlegung nach:

- Krankenhaus
- Hausarzt/ Facharzt
- Pflegeeinrichtung (stationär oder ambulant)
- Reha-Einrichtung

Bei o. g. Patientin/ Patienten wurde folgender multiresistenter Erreger nachgewiesen:

- MRSA (methicillin-resistenter Staphylococcus aureus)
- 3-MRGN
- 4-MRGN
- VRE (Vancomycin-resistenter Enterococcus)
- Sonstiger multiresistenter Erreger:

Erstnachweis am:
 Trägerstatus:
 Kolonisation:
 Infektion:

Der Erregernachweis erfolgte an nachstehender Lokalisation:

	pos.	neg.	pos.	neg.	pos.	neg.
Nasenvorhöfe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Blutkultur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mund-, Rachenraum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Liquor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sputum/ Tracheasekret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Urin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vaginal-/ Genitalregion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stuhl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Achsel re/ l.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wunde: PEG SPK sonstige

Einstichstellen von: abgeschlossen am: fortsetzen bis:

Sanierungsmaßnahmen MRSA:

Nase	3 x tgl., 5-7 Tage Mupirocin-Salbe (bei Mupirocin-Resistenz PVP-Jod 1,25%)
Rachen	3 x tgl., 5-7 Tage mit antisept. Mundspülung z. B. Odenicol®, ProntoOral® etc.
Haut/ Haare	1-2 x tgl., 5-7 Tage mit antisept. Seife/ Waschlotion z. B. Odenisan®, Deconteman®, Prontoderm® etc.
Wundbehandl.	<input type="checkbox"/> Figene Trilette empfohlen

Weitere Maßnahmen bei MRSA/ MRE:

Antibiotikabehandlung mit Konsequente Basishygiene Strikte Isolierung

Kontrolle des Sanierungserfolges 3 Tage nach Beendigung der Sanierungsmaßnahmen:

	pos.	neg.	pos.	neg.
1. Abstrich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nach 3-6 Monaten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nach 6-12 Monaten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte nur ankreuzen, welche Kontrolle in Ihrer Einrichtung erfolgt ist, und wenn vorliegend, Befund eintragen.

Datum:



Kontrolle des Sanierungserfolges 3 Tage nach Beendigung der Sanierungsmaßnahmen:

Weitere Vorgehensweise ambulant:

Weitere Vorgehensweise stationär:

	1. Abstrich	pos.	neg.		1. Abstrich	pos.	neg.
	Nach 3-6 Monaten	pos.	neg.		2. Abstrich	pos.	neg.
	Nach 6-12 Monaten	pos.	neg.		3. Abstrich	pos.	neg.
					Nach 1 Monat	pos.	neg.
					Nach 3-6 Monaten	pos.	neg.
					Nach 6-12 Monaten	pos.	neg.



Vielen Dank für Ihr Interesse.